

保護者の方へ：必ずお読みください。

おたふくかぜワクチン予防接種のお知らせ 《予防接種説明書》

- おたふくかぜは「流行性耳下腺炎」とも呼ばれ、主な症状は唾液腺のはれと痛みで発熱を伴うこともあります。まれに合併症として高熱やけいれんを伴う「無菌性髄膜炎」を起こすことがあります。感染経路は飛沫感染と接触感染で伝染していきます。
- おたふくかぜワクチン接種は任意の予防接種ですが、遠野市では子育て支援として初回の1回に限り無料で実施しています。
- 対象者のうち、保護者の意思と責任で接種を希望する方は、この予防接種説明書の内容をご確認の上、接種をしてください。

- 1 接種お勧め年齢 **1歳～2歳**（なるべく早めの接種をお勧めします。）
- 2 助成対象者 1歳～小学校就学前まで
- 3 接種場所 市指定医療機関（下記の実施医療機関一覧をご覧ください。）
- 4 接種費用 原則無料
- 5 助成回数 初回1回
- 6 持ち物 母子健康手帳 予防接種予診票 ※同時接種の場合、同時接種同意書
- 7 その他 **《定期接種》麻疹風しん、水痘を優先して接種してください。**
※既におたふくかぜに罹患したことがある人は予防接種を受ける必要はありません。



《 おたふくかぜワクチン予防接種実施医療機関一覧 》

- ・日時については、医療機関によって異なりますので、事前に確認し、必ず予約をしてから接種してください。
- ・医療機関では接種予約を受付した後、ワクチンを取り寄せ接種の準備をします。体調不良などで予約日に接種できない場合は、速やかに医療機関に連絡の上、改めて接種する日程をご相談ください。
- ・市指定医療機関以外（市外）で接種する場合は、予防接種保険適用の都合上、接種する前に手続きが必要となりますので、事前に市母子安心課までお問合せください。

	医療機関名	電話番号	予約	受付時間	予防接種実施日					
					月	火	水	木	金	土
1	あいずみ 内科医院	63-2021	要予約	9:30～11:00	○	○	○	○	○	
				14:00～17:00	○	○		○	○	
2	柏原医院	67-3016	要予約	8:30～12:00	○	○	○	○	○	
				16:00～17:30	○	○			○	
3	鱒沢診療所	66-2273	要予約	13:00～14:00	○		○		○	
		(67-3016)								
4	川上医院	62-2051	要予約	9:00～11:00	○	○	○		○	
				15:00～17:00	○	○	○		○	
5	千葉医院	62-4039	要予約	14:00～15:00		○				
6	守口医院	63-2170	要予約	9:00～12:00	○	○	○	○	○	○
				14:30～17:00	○	○		○	○	
7	遠野病院	62-2222	要予約	13:00～13:30		○	○			
		※パソコン・スマホ・携帯電話から予防接種・健診のインターネット予約ができます。 ※電話での予約問い合わせは、月、木曜日の午後2時～4時にしてください。								

《裏面も必ずお読みください》

◆予防接種後に起こるかもしれない体の変化

- ・接種後2～3週間後、まれに一過性の耳下腺の腫れや発熱が見られることがあります。
また、無菌性髄膜炎や急性散在性脳脊髄炎、脳炎、脳症、難聴などの中枢神経系の副反応があります。

◆予防接種を受けるときのご注意

- ・お子さんの健康状態の良いときに受けましょう。
- ・この説明書を読んでから、予防接種予診票を記入してください。心配なことは医師に相談しましょう。
- ・接種の際には、保護者の方か、日頃からお子さんの健康状態をよく知っていて医師の質問に答えられる方が付き添ってください。



◆予防接種を受けることができない人

- ・明らかに発熱している人(37.5℃以上)
- ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ・その日受ける予防接種によって、または予防接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーショック症状を呈したことがあることが明らかな人
- ・麻しん（はしか）にかかり治癒後4週間経過していない人
- ・風しん・おたふくかぜ・水ぼうそうにかかり治癒後2～4週間経過していない人
- ・突発性発疹・手足口病・インフルエンザにかかり治癒後1～2週間経過していない人
- ・その他、かかりつけの医師が予防接種を受けるのに不適切な状態と判断した人

◆予防接種を受ける前に、医師とよく相談しなければならない人

- ・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある人
- ・前に予防接種を受けた時、接種後に発熱、発しん、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた人
- ・過去にけいれんの既往のある人
- ・過去に免疫不全の診断がなされている人
- ・接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人

◆予防接種後の注意

- ・接種後30分はお子さんの様子をよく確認してください。
- ・接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。また、激しい運動は避けてください。
- ・接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- ・接種した日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすったりしないでください。
- ・接種後、注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけ等の症状が現れた場合、医師の診察を受けてください。
また、医師の診察を受けた後は、下記担当までご連絡ください。

◆健康被害救済制度について

- ・おたふくかぜワクチン接種を受けて健康被害が生じた場合には、遠野市予防接種事故災害補償規則に基づく救済の対象となります。救済制度の申請が必要になった場合には、診察した医師及び下記担当へご相談ください。